REGANANCIA DE PESO EN TIEMPOS DE COVID 19

*Dr. Helard Manrique
Clínica Delgado
Centro de investigación
en Diabetes Obesidad y Nutrición
Universidad Peruana Cayetano Heredia
helardmanrique@gmail.com*

CONSECUENCIAS DE LA CUARENTENA

Declaración de conflictos de interés

Dr. Helard Manrique, Personal/Profesional Relación con la Industria

Conflictos de interés	Nombre de la institución y/o empresa	Rol
Instituciones	Sociedad Peruana de Endocrinología	Past Presidente
Fondos de Ensayos Clínicos	Sanofi, Astra Zeneca	Investigador
Industria Advisory/Consultor	Eli Lilly, , Boehringer Ingelheim	Speaker/Consultor/ Advisory Boards

“*Alucinación es una percepción no controlada; la realidad es una percepción controlado y compartida*” – Anil Seth

***Entonces la obesidad es una enfermedad alucinante, pues es una percepción compartida y no controlada* – Ricardo Rosero**

En tiempos del COVID 19

Amor en los tiempos del

CORONAVIRUS.

CONSECUENCIAS DE LA CUARENTENA

DÍA 1

DÍA 14

● 20% OBESIDAD

● 58% SOBREPESO Y OBESIDAD

7.0% DIABETES MELLITUS

**Presencia
de pre diabetes
en un 22.4%**

ES LA OBESIDAD UNA ENFERMEDAD?

- 1. Es un estilo de vida,**
- 2. No tiene síntomas específicos**
- 3. Es un factor de riesgo para otras enfermedades**
- 4. No tiene cobertura de seguros**

ES LA OBESIDAD UNA ENFERMEDAD?

- 4. Produce más de 225 de comorbilidades relacionadas a Obesidad**
- 5. Está relacionada a complicaciones de múltiples patologías quirúrgicas y no quirúrgicas**
- 6. Esta relacionada a muerte prematura**

GENÉTICA Y AMBIENTE

Obesidades puramente ambientales

**OBESIDADES
POLIGÉNICAS**
(la inmensa mayoría)

Obesidades monogenicas con penetrancia variable
MCR4 R

Obesidades monogenicas dominantes
Lep, Lep R
PC1
(prohormona convertasa I)
PCOM

ANTES
cuarentena

POST
CUARENTENA

Factores al incrementos de peso durante una cuarentena

Factores de Riesgo Asociados a Sobrepeso y Obesidad

Control del Stress y Ansiedad **Hábitos de Alimentación y Estilos de vida**

1. Rol del control del apetito y adicciones
2. Conceptos sobre alimentación saludable
MACRONUTRIENTES
 - Ingesta de Alimentos de alto contenido calórico
 - Ingesta de Alimentos ricos en grasas saturadas
 - Ingesta de Alimentos ricos en grasas trans.
 - Baja ingesta de verduras y frutas

II. Sedentarismo

1. Permanencia en pantallas 2 horas /día
2. Baja actividad física

- Las personas con obesidad presentan un riesgo superior a padecer trastornos y alteraciones psicológicas que las personas con normopeso.

Triángulo de la obesidad - COD²

Abordaje integral

- Las personas con obesidad presentan un riesgo superior a padecer trastornos y alteraciones psicológicas que las personas con normopeso.

ROL DEL CONTROL DEL COMER?

Hambre

Responde a **necesidades fisiológicas**

Funciona como el **impulso** mas **básico**.

Es la **búsqueda del alimento** para satisfacer los **requerimientos vitales**.

Señales de hambre:

- Estómago vacío o ruidoso,
- Disminución de los niveles de glucosa en sangre
- Variaciones hormonales (ej. Aumento de ghrelina, disminución de insulina y leptina).

Apetito

Búsqueda del alimento para satisfacer el **deseo** de un **sabor específico**

Factor principalmente **psicológico**.

Un deseo **emocional**.

Puede estar **desligado** de cualquier necesidad nutricional.

Asociado a:

Experiencias sensoriales previas.

Los sentidos(olor,gusto,etc).

Señales emocionales,

Situaciones sociales y

Convenciones culturales.

HAMBRE

APETITO (CUARENTENA)

Reflejo incondicional

Reflejo condicionado

Es subconsciente

Consciente

No es selectivo

Selectivo

**No es modificado por
estímulos ambientales**

**Es modificado por
estímulos ambientales**

Tiene manifestación somática

**No tiene manifestación
somática**

Hambre emocional?..

¿Porqué comemos
sin hambre?

Apetito!!!

Ansiedad , desánimo, alegría,
frustración.....

saciación

vs

saciedad

Saciación

Proceso que determina cuando se **suspende** el acto de comer.

Delimita el **final** de un episodio alimentario.

Determina la cantidad de alimento ingerido en **una comida**

Chapelot D. Quantifying satiation and satiety. 2013

Se identifica por su **corta duración de aproximadamente 20 min** desde el inicio de la ingesta alimentaria.

Se caracteriza por la intervención de:

- Factores sensoriales,
- Composición de macronutrientes,
- Densidad energética,
- **Factores cognitivos y pre-absortivos tempranos**

Blundell J, De Graaf C. Obes Rev 2010; 11 (3): 251-70

Bellisle F, Blundell J. Satiating, satiety and the control of food intake, theory and practice. 2013

Saciada

d

Percepción que tiene el cuerpo humano de **no tener necesidad inmediata de ingesta** de alimentos.

Determina el **espaciamiento entre comida y comida** o entre ingesta e ingesta.

Es una respuesta homeostática del organismo, dirigida a **restablecer el equilibrio** cuando la demanda de nutrientes queda satisfecha.

Mecanismos de regulación del hambre en el hipotálamo

El **Núcleo Arcuato** (Narc) está localizado en el hipotálamo medial.

Importante **centro de regulación de la ingesta**.

Integra las señales hormonales para la homeostasis energética.

Contiene:

- Neuronas que liberan **neuropéptidos estimulantes** del hambre:
 - Neuropéptido Y (**NPY**)
 - Péptido relacionado con la proteína Agouti (**AgRP**)
- Neuronas que liberan **neuropéptidos inhibitorios** del hambre:
 - Pro-opiomelanocortina (**POMC**)
 - Transcrito Regulado por Cocaína y Anfetaminas (**CART**)

HOMEOSTASIS Y BALANCE ENERGETICO

ADICCIÓN : DEFINICIÓN

- *La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza **por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas para la salud.***
- *Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican su estructura y funcionamiento.*
- *Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos o inadecuados que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas.*

DIFERENTES TIPOS DE ADICCIONES

Todas estas actividades tienen en común incrementan la fuertemente la liberación de DOPAMINA en el núcleo accumbens (Centro del placer)

DOPAMINA: FUNCIONES EN EL ORGANISMO

NEUROTRANSMISORES Y PLACER

El sistema dopaminérgico es la principal vía implicada en los comportamientos adictivos. En toda recompensa y placer, la dopamina es el químico final de activación.

EN CUARENTENA

Sugar addiction: the state of the science

Margaret L. Westwater^{1,2} · Paul C. Fletcher^{2,3,4} · Hisham Ziauddeen^{2,3,4,5}

ADICCIÓN A LA COMIDA *Definición*

ADICCIÓN A LA COMIDA: Definición

La adicción a la comida, no tiene una definición específica, sino que utiliza la misma definición que las drogas de abuso (cocaína, alcohol, anfetaminas, etc) es decir su diagnóstico se basaría en los mismos criterios, a saber:

¿ES LA COMIDA ADICTIVA?

Comparación entre adicción a drogas y a la comida

	<i>Adicción a drogas</i>	<i>Adicción a la comida</i>
<i>Tolerancia</i>	<i>Cada vez más cantidad de droga para sentir el mismo placer</i>	
<i>Tiempo</i>	<i>Mucho tiempo dedicado al</i>	
<i>Abstinencia</i>	<i>Irritabilidad y ansiedad cuando se intenta abandonar la droga</i>	
<i>Conciencia</i>	<i>Continuar con el consumo a pesar de conocer sus efectos adversos para la salud</i>	
<i>Consumo</i>	<i>Generalmente a solas</i>	<i>Generalmente a solas</i>

Los estudios realizados en animales y humanos sugieren que la adicción a la comida **cumple con todos los criterios para un desorden adictivo** según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM).

**LAS DIETAS
ULTRA
PROCESADAS
AUMENTAN
LA INGESTA
CALÓRICA Y
CAUSAN
AUMENTO
DE PESO**

Hall KD et al *Cell Metab* 2019

EJEMPLOS DE CENA

Hall, K. D., et. al (2019). Ultra-processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: A one-month inpatient randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. *Cell Metabolism*.

EJEMPLOS DE APERITIVOS

Hall, K. D., et. al (2019). Ultra-processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: A one-month inpatient randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. *Cell Metabolism*.

**LAS DIETAS
ULTRA
PROCESADAS
AUMENTAN
LA INGESTA
CALÓRICA Y
CAUSAN
AUMENTO
DE PESO**

Hall KD et al *Cell Metab* 2019

LA DIETA PUEDE ALTERAR LOS PATRONES DIURNOS DE MICROBIOMA INTESTINAL

ALIMENTACIÓN ACTUAL ALTAMENTE ADICTIVA

COMIDA "CHATARRA" Y ADICCIÓN

ADICCIÓN A LA COMIDA. Estudios Animales

Las galletas Oreo son tan adictivas como la cocaína, según un estudio

- *Un experimento realizado en el Colegio de Connecticut con ratas de laboratorio **mostró que los roedores obtenían tanto o más placer con las galletas que con la cocaína o morfina.***
- *En conjunto, los hallazgos obtenidos en este estudio apoyan la hipótesis **de que el consumo de comida con mucha grasa y azúcar puede llevar a comportamientos adictivos y puede activar el cerebro de una forma similar al abuso de drogas***

CARBOHIDRATOS – GRASAS – SAL Y PLACER

Eur J Nutr (2016) 55 (Suppl 2):S55–S69
DOI 10.1007/s00394-016-1229-6

REVIEW

Sugar addiction: the state of the science

Margaret L. Westwater^{1,2} · Paul C. Fletcher^{2,3,4} · Hisham Ziauddeen^{2,3,4,5}

ADICCIÓN A LA COMIDA
***¿Cuáles son los alimentos
más adictivos?***

ADICCIÓN : Alimentos naturales vs procesados

- *Los alimentos en su estado natural son muy poco adictivos, al contrario de los alimentos procesados, los cuales han sido alterados o procesados (altos en grasas, carbohidratos y sal), de una manera que incrementa fuertemente su potencial de abuso (sobrealimentación).*
- *Es posible que estos alimentos procesados puedan generar respuestas biológicas y conductuales similares a las drogas de abuso, debido a su no natural alto nivel de recompensa.*

METABOLISMO DE LA SACAROSA

Metabolismo de la fructosa

Fructosa y ácido úrico – Potencial mecanismo de insulinoresistencia

El peligro de la FRUCTOSA

HEPATOLOGY COMMUNICATIONS, VOL. 3, NO. 1, 2019

Childhood Fructoholism and Fructoholic Liver Disease

Andreia Ribeiro,¹ Maria-Jose Igual-Perez,¹ Ermelinda Santos Silva,² and Etienne M. Sokal ¹

Cell Metabolism 27, 351–361, February 6, 2018

NUNCA JUGOS

Tomé foto a algunas frutas.
La imagen que ves, es el tamaño REAL de alimento que contiene 15 g de carbohidrato. Coloqué los pesos de cada una para que puedas pesarlo en casa haciendo uso de una balanza de alimentos.
La balanza es una herramienta útil al empezar el aprendizaje del conteo de carbohidratos pues te permite saber, con precisión, cuánto carbohidrato estás consumiendo

FRUTAS

Fructose induced lipogenesis: from sugar to fat to insulin resistance

Varman T. Samuel^{1,2}

¹ Departments of Internal Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06536-8012, USA

² Veteran's Affairs Medical Center, West Haven, CT 06516, USA

TRENDS in Endocrinology & Metabolism

Estudios administrando fructosa a animales ...

- Hiperuricemia
- HDL bajo
- Ganancia de peso
- Incremento de PA
- Intolerancia a la glucosa
- Hígado Graso

Disfunción endotelial

Stress oxidativo

Activación del SN simpático

Activación del SRA

Inflamación sistémica

Hígado graso

Incremento de grasa intraabdominal

Resistencia a la leptina

Proteinuria

Hipertrofia renal

Hipertensión glomerular

Enfermedad renal microvascular

SACAROSA es de elevado Índice Glicémico elevado y contribuye:

- 1. Hyperinsulinemia**
- 2. Hipoglicemia**
- 3. Ingesta de comida**
- 4. Resistencia a la Insulina**
- 5. Acidos grasos libres y triglicéridos**

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS MÁS ADICTIVOS?

Pizza

Chocolate

Papas Fritas Bolsa

Galletas de Chocolate

Helados

Papas Fritas Caseras

Hamburguesa con Queso

Bebidas Azucaradas

Pasteles

Queso

ADICCIÓN A LA COMIDA
Prevalencia

PREVALENCIA ADICCIÓN A LA COMIDA (YFAS) (Yale Food Addiction

	Promedio
<i>Población general adulta</i>	5,4%
<i>Obesos en tratamiento</i>	25%
<i>Obesos sin tratamiento</i>	15,2%
<i>Obesos con “atracones”</i>	56,8%
<i>Adolescentes</i>	8,8%
Niños	7,2%

TRATAMIENTO ADICCIÓN A LA COMIDA

El tratamiento actual de la adicción a la comida en los obesos, contempla tres áreas.

Alimentación PROHIBIDA EN CUARENTENA	<ul style="list-style-type: none">• <i>Eliminación de alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, grasas y sal</i>
Psicoterapia	<ul style="list-style-type: none">• <i>Terapia cognitivo – conductual</i>
Farmacoterapia	<ul style="list-style-type: none">• <i>Fentermina- Topiramato</i>• <i>Naltrexona – Bupropión</i>• <i>Topiramato Otros</i>

REVIEWS

Contribution of macronutrients to obesity: implications for precision nutrition

Rodrigo San-Cristobal ¹, Santiago Navas-Carretero ^{2,3,4} ,
Miguel Ángel Martínez-González ^{3,4,5,6}, José María Ordovas ^{7,8,9}
and José Alfredo Martínez^{1,2,3,4}

Nature Reviews | Endocrinology 31 Marzo 2020

GRASAS VS CARBOHIDRATOS

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

Mahshid Dehghan, Andrew Mente, Xiaohe Zhang, Sumathi Swaminathan, Wei Li, Viswanathan Mohan, Romaina Iqbal, Rajesh Kumar, Edelweiss Wentzel-Viljoen, Annika Rosengren, Leela Itty Amma, Alvaro Avezum, Jephth Chifamba, Rafael Diaz, Rasha Khatib, Scott Lear, Patricia Lopez-Jaramillo, Xiaoyun Liu, Rajeev Gupta, Noushin Mohammadifard, Nan Gao, Aytekin Oguz, Anis Safura Ramli, Pamela Seron, Yi Sun, Andrzej Szuba, Lungiswa Tsolekile, Andreas Wielgosz, Rita Yusuf, Afzal Hussein Yusufali, Koon K Teo, Sumathy Rangarajan, Gilles Dagenais, Shrikant I Bangdiwala, Shafiqul Islam, Sonia S Anand, Salim Yusuf, on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators*

Findings During follow-up, we documented 5796 deaths and 4784 major cardiovascular disease events. Higher carbohydrate intake was associated with an increased risk of total mortality (highest [quintile 5] vs lowest quintile [quintile 1] category, HR 1.28 [95% CI 1.12–1.46], $p_{trend}=0.0001$) but not with the risk of cardiovascular disease or cardiovascular disease mortality. Intake of total fat and each type of fat was associated with lower risk of total mortality (quintile 5 vs quintile 1, total fat: HR 0.77 [95% CI 0.67–0.87], $p_{trend}<0.0001$; saturated fat, HR 0.86 [0.76–0.99], $p_{trend}=0.0088$; monounsaturated fat: HR 0.81 [0.71–0.92], $p_{trend}<0.0001$; and polyunsaturated fat: HR 0.80 [0.71–0.89], $p_{trend}<0.0001$). Higher saturated fat intake was associated with lower risk of stroke (quintile 5 vs quintile 1, HR 0.79 [95% CI 0.64–0.98], $p_{trend}=0.0498$). Total fat and saturated and unsaturated fats were not significantly associated with risk of myocardial infarction or cardiovascular disease mortality.

Interpretation High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality. Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease, myocardial infarction, or cardiovascular disease mortality, whereas saturated fat had an inverse association with stroke. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these findings.

Figure 1: Association between estimated percentage energy from nutrients and total mortality and major cardiovascular disease (n=135 335)

Adjusted for age, sex, education, waist-to-hip ratio, smoking, physical activity, diabetes, urban or rural location, centre, geographical regions, and energy intake.

Major cardiovascular disease=fatal cardiovascular disease+myocardial infarction+stroke+heart failure.

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

APRIL 4, 2013

VOL. 368 NO. 14

Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet

Ramón Estruch, M.D., Ph.D., Emilio Ros, M.D., Ph.D., Jordi Salas-Salvadó, M.D., Ph.D.,
 Maria-Isabel Covas, D.Pharm., Ph.D., Dolores Corella, D.Pharm., Ph.D., Fernando Arós, M.D., Ph.D.,
 Enrique Gómez-Gracia, M.D., Ph.D., Valentina Ruiz-Gutiérrez, Ph.D., Miquel Fiol, M.D., Ph.D.,
 José Lapetra, M.D., Ph.D., Rosa Maria Lamuela-Raventos, D.Pharm., Ph.D., Lluís Serra-Majem, M.D., Ph.D.,
 Xavier Pintó, M.D., Ph.D., Josep Basora, M.D., Ph.D., Miguel Angel Muñoz, M.D., Ph.D., José V. Sorlí, M.D., Ph.D.,
 José Alfredo Martínez, D.Pharm., M.D., Ph.D., and Miguel Angel Martínez-González, M.D., Ph.D.,
 for the PREDIMED Study Investigators*

A Primary End Point (acute myocardial infarction, stroke, or death from cardiovascular causes)

No. at Risk						
Control diet	2450	2268	2020	1583	1268	946
Med diet, EVOO	2543	2486	2320	1987	1687	1310
Med diet, nuts	2454	2343	2093	1657	1389	1031

B Total Mortality

No. at Risk						
Control diet	2450	2268	2026	1585	1272	948
Med diet, EVOO	2543	2485	2322	1988	1690	1308
Med diet, nuts	2454	2345	2097	1662	1395	1037

Figure 1. Kaplan–Meier Estimates of the Incidence of Outcome Events in the Total Study Population.

Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial

Michael E J Lean*, Wilma S Leslie, Alison C Barnes, Naomi Brosnahan, George Thom, Louise McCombie, Carl Peters, Sviatlana Zhyzhneuskaya, Ahmad Al-Mrabeh, Kieren G Hollingsworth, Angela M Rodrigues, Lucia Rehackova, Ashley J Adamson, Falko F Sniehotta, John C Mathers, Hazel M Ross, Yvonne McIlvenna, Renae Stefanetti, Michael Trenell, Paul Welsh, Sharon Kean, Ian Ford, Alex McConnachie, Naveed Sattar, Roy Taylor*

Summary

Background Type 2 diabetes is a chronic disorder that requires lifelong treatment. We aimed to assess whether intensive weight management within routine primary care would achieve remission of type 2 diabetes.

Lancet 2018; 391: 541-51

Published Online

Figure 2: Primary outcomes and remission of diabetes in relation to weight loss at 12 months

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA DIETA EN CUARENTENA

5,000 AÑOS COMIENDO PAN

**Y DE REPENTE EN UNA DÉCADA TODO
EL MUNDO ES ALÉRGICO AL GLUTEN**

1 pieza de
pan de molde
con granos
integrales

73 Kcal

1 tortilla
blanca
77 Kcal

1 Croissant
(70g)

300 Kcal

1 pan
francés
83 Kcal

1 pan pita
165 Kcal

1 "wawa"
480 Kcal

1 pan de
yema
190 Kcal

Bread Affects Clinical Parameters and Induces Gut Microbiome-Associated Personal Glycemic Responses

Tal Korem,^{1,2,7} David Zeevi,^{1,2,7} Niv Zmora,^{3,4,5} Omer Weissbrod,^{1,2} Noam Bar,^{1,2} Maya Lotan-Pompan,^{1,2} Tali Avniti-Sagi,^{1,2} Noa Kosower,^{1,2} Gal Malka,^{1,2} Michal Rein,^{1,2} Jotham Suez,³ Ben Z. Goldberg,⁸ Adina Weinberger,^{1,2} Avraham A. Levy,^{3,4} Eran Elinav,^{3,4} and Eran Segal^{1,2,6,*}

¹Department of Computer Science and Applied Mathematics

²Department of Molecular Cell Biology

³Department of Immunology

Weizmann Institute of Science, Rehovot 7610001, Israel

⁴Internal Medicine Department, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv 6423906, Israel

⁵Research Center for Digestive Tract and Liver Diseases, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv 6423906, Israel

⁶Department of Plant and Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science, Rehovot 7610001, Israel

⁷These authors contributed equally

⁸Lead contact

*Correspondence: avl.levy@weizmann.ac.il (A.A.L.), eran.elinav@weizmann.ac.il (E.E.), eran.segal@weizmann.ac.il (E.S.)

<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2017.05.002>

Esto puede ofrecer una nueva explicación para la relación equívoca observada para los cereales integrales en la salud: dependiendo de la composición de la microbiota intestinal, la respuesta al cereal integral o refinado puede cambiar, y por lo tanto, su impacto metabólico.

- Las personas mostraron respuestas glicémicas postprandiales personalizadas para el pan .
- Se mostró variación interpersonal significativa en las respuestas glicémicas a los dos tipos de pan (blanco e integral)
- **Algunos presentaron respuesta glicémicas más elevadas frente a un tipo de pan mas no con el otro tipo.**
- **Se mostró que el tipo de pan que induciría una mayor respuesta glicémica en una persona podría predecirse para cada persona usando data de su microbioma**

PAN CON PROTEINA MAYOR IMPACTO EN EL CONTROL DE LA GLICEMIA Y LIBERACION DE INSULIN

International Journal of Food Sciences and Nutrition

ISSN: 0963-7486 (Print) 1465-3478 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/ijf20>

The effects of the combination of egg and fiber on appetite, glycemic response and food intake in normal weight adults – a randomized, controlled, crossover trial

Angela L. Bonnema, Deena K. Altschwager, William Thomas & Joanne L. Slavin

PAN CON PROTEINA MAYOR IMPACTO EN EL CONTROL DE LA GLICEMIA Y LIBERACION DE INSULIN

Figure 4. Blood glucose response over time. The line graph displays the changes over the 180-m period; different letters denote significant differences for peak blood glucose ($p < 0.0001$), Mean AUC and peak $\pm$ SEM. The bar graph depicts total AUC for the 180-m period; different letters denote significant differences for AUC ($p = 0.002$) over 180 min. C-LP ($\blacktriangle$), cereal low protein; E-MPF ($\blacklozenge$), egg moderate protein with fiber; E-HP ($\blacksquare$), egg high protein.

Oxidative Priority, Meal Frequency, and the Energy Economy of Food and Activity: Implications for Longevity, Obesity, and Cardiometabolic Disease

Raymond J. Cronise, BS,¹ David A. Sinclair, PhD,^{2,3} and Andrew A. Bremer, MD, PhD⁴

¿QUÉ ES LO QUE TÚ COMES?

FIG. 3. Fuel utilization and partitioning with physical activity versus calorie restriction. A 1-hr block of time spent sitting is compared to a 1-hr block of time spent jogging. **(A)** At an RMR of 1800 kcal/day (a typical individual), a predicted resting RQ of 0.85 (49.3% fat oxidation) results in 75 kcal/hr EE and 37 kcal/hr fat utilization. During activity, the rise in RQ to 0.96 (12.8% fat oxidation) results in 500 kcal/hr EE and 64 kcal/hr fat utilization. For comparison, the change in fat utilization between rest and activity equates to slightly more than a $\frac{1}{2}$ teaspoon of olive oil (~ 40 kcal/tsp). **(B)** During times of sustained calorie restriction, resting RQ may drop to an RQ of 0.78 ($\sim 74\%$ fat oxidation) due to increased fat utilization, resulting in ~ 55 kcal/hr fat utilization. This is a difference of only 9 kcal (less than a $\frac{1}{4}$ teaspoon of olive oil) from the 64 kcal/hr fat utilization predicted during physical activity in a noncalorie-restricted state. EE, energy expenditure; RMR, resting metabolic rate.

Termodinámica de la alimentación

- **En ayunas** la energía metabólica se obtiene de las reservas corporales, al ser prolongado se utiliza el glucógeno y posterior la oxidación de grasas.
- **Las cetonas** contribuyen a la actividad metabólica en un 60 a 70% de necesidades energéticas del cerebro durante el agotamiento del glucógeno.
- **La glucosa** se mantiene en sangre por la gluconeogénesis y por los AA glucogénicos.

Cada comida sucesiva, interrumpe el periodo de ayuno y obliga al cuerpo a tomar medidas sobre el combustible recién ingerido.

El combustible ingerido es discreto:

- Metabolizá
- Almacenará
- Eliminará
- Una combinación de los mismos

¿cómo decide el cuerpo qué combustible utilizar, eliminar o almacenar?

FIG. 5. Oxidative priority of macronutrient disposal. An oxidative prioritization of macronutrients predicts the partitioning hierarchy based on the inverse relationship of storage capacity. Not all macronutrients can be stored at the same level. For example, alcohol has no long-term storage capacity, while fat has a relatively unlimited capacity. While the postprandial DIT rise is highest for protein and lowest for fat, these metabolic increases do not necessarily reflect utilization of stored energy reserves and are rather better explained by the need to mitigate postprandial rises in blood nutrient levels. In nearly all cases, postprandial blood analyte levels that increase due to meals normalize within 4–6 hr as the postabsorptive state is reached. ALC, alcohol; CHO, carbohydrate; DIT, diet-induced thermogenesis; FAT, fat; PRO, protein

Cell Metabolism

Daily Fasting Improves Health and Survival in Male Mice Independent of Diet Composition and Calories

**EL AYUNO DIARIO
MEJORA LA SALUD
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA COMPOSICIÓN
DE LA DIETA**

Eating time	Feeding regimen	Delayed disease onset	Lifespan extension
24 hours	- Ad libitum	-	-
13 hours	- Meal-fed	+	+
3 hours	- CR	+++	+++

Mitchell, SJ et al. Cell Metab 2019;29:221.

ORDEN DE LAS COMIDAS

Respuesta de glucosa

Postprandial

Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels

Diabetes Care 2015;38:e98–e99 | DOI: 10.2337/dc15-0429

*Alpana P. Shukla, Radu G. Iliescu,
Catherine E. Thomas, and
Louis J. Aronne*

Postprandial hyperglycemia is an important therapeutic target for optimizing glycemic control and for mitigating the proatherogenic vascular environment characteristic of type 2 diabetes. Existing evidence indicates that the quantity and type of carbohydrate consumed influence blood glucose levels and that the total amount of carbohydrate consumed is the primary predictor of glyce-

first visit, the food order was carbohydrate (ciabatta bread and orange juice), followed 15 min later by protein (skinless grilled chicken breast) and vegetables (lettuce and tomato salad with low-fat Italian vinaigrette and steamed broccoli with butter); the food order was reversed a week later. Blood was sampled for glucose and insulin measurements at baseline (just before

this meal pattern may improve insulin sensitivity. A limitation of the study is that we analyzed glucose and insulin responses up to 120 min following meal ingestion, as this study was designed to test postprandial glucose levels as practically measured by patients with type 2 diabetes. Further studies with longer follow-up to delineate the full impact, including delayed effects and the mechanisms underlying the gly-

- 11 sujetos con:
 - DM2
 - IMC promedio 32.9 Kg/m²

KCAL	628 kcal
CHO	68 g
PROT	55 g
GRASA	16 g

Se les administró una comida **ISOCALÓRICA** durante 2 días distintos y en semanas separadas

- **1er día:** Lo primero que consumieron del plato fue el carbohidrato, luego proteína y vegetales
- **2do día:** Lo primero que consumieron del plato fue Proteína, vegetales y carbohidrato
- Se les midió:
 - Glucosa e insulina basal
 - Glucosa e Insulina a los 30, 60 y 120 min después de ingerir la comida

Aquellos que consumieron **PRIMERO** las **PROTEÍNAS** y las **VERDURAS** tuvieron **GLUCOSAS** e **INSULINAS SIGNIFICATIVAMENTE MENORES** que aquellos que consumieron los carbohidratos primero

- La magnitud del **EFFECTO DEL ORDEN** de los alimentos sobre las **GLUCOSAS POSTPRANDIALES** es comparable con las que se observan con **AGENTES FARMACOLÓGICOS** cuyo objetivo es disminuir glucosa postprandial
- El estudio sugiere que **“El orden de la ingesta del carbohidrato durante un tiempo de comida también importa “**
- **Debemos tomar en cuenta : CUÁNTO, QUÉ y EN QUÉ ORDEN CONSUME alimentos**

MARCANDO DIFERENCIAS EN LA DIETA

**NUMERO DE COMIDAS EN
CUARENTENA**

Reduction in Glycated Hemoglobin
and Daily Insulin Dose Alongside
Circadian Clock Upregulation in
Patients With Type 2 Diabetes
Consuming a Three-Meal Diet: A
Randomized Clinical Trial

<https://doi.org/10.2337/dc19-1142>

*Daniela Jakubowicz,¹ Zohar Landau,¹
Shani Tsameret,² Julio Wainstein,¹
Itamar Raz,³ Bo Ahren,⁴ Nava Chapnik,²
Maayan Barnea,⁵ Tali Ganz,¹
Miriam Menaged,¹ Naomi Mor,¹
Yosefa Bar-Dayana,¹ and Oren Froy²*

September 23, 2019

3 Meals Diet versus **6 Meals Diet**

3MDiet with High Energy Breakfast is an Effective Strategy for Weight Loss and Reduction of Glucose Variability and of TDID in T2D

Daniela Jakubowicz, Oren Froy, Shani Tsameret, Julio Wainstein, Itamar Raz, Bo Ahren, Maayan Barnea, Nava Chapnik, Miriam Menaged, Naomi Mor, Tali Ganz, Zohar Landau

Diabetes Unit Wolfson Medical Center
Sackler Faculty of Medicine Tel Aviv University
Institute of Biochemistry, Food Science and Nutrition
The Hebrew University of Jerusalem
Israel

Rationale

Obese + T2D and IR

Require
High Insulin Doses

Weight Gain

Worsening
IR and Glycemic Control
→ ↑FG, ↑PPHG, ↑HbA1c and
↑Glucose Variability

Vicious Cycle

Ever-Increasing
Insulin Dose

Continuing Weight Gain

Persistent
Hyperglycemia

High Risk for
Diabetes Complications

Weight Loss Over Time (Kg)

HbA_{1c} [%] Over Time

Δ HbA_{1c} Over Time

3Mdiet

6Mdiet

El efecto de la frecuencia de las comidas en el peso corporal, HbA1c y el gasto energético en reposo en pacientes con DM2

H. Kahleova¹, L. Belinova¹, M. Hill², T. Pelikanova¹

¹*Institute for Clinical and Experimental Medicine*

RÉGIMEN: 2 vs 6 comidas al día

2 meals

Breakfast	6-10 h
Lunch	12-16 h

6 meals

Breakfast	6-8 h
Snack	8-10 h
Lunch	11-13 h
Snack	14-15 h
Dinner	17-18 h
2nd Dinner	20-21 h

Reducción de los agentes hipoglucemiantes orales

2 meals

6 meals

PESO

IMC

Glucosa Plasmática en Ayunas Péptido - C

Resumen

2 meals a day resulted in:

1. A greater $\downarrow$ weight, $\downarrow$ fasting plasma glucose and C-peptide
2. Comparable $\uparrow$ insulin sensitivity
3. Comparable $\downarrow$ HbA1c and lipids
4. Trend toward a smaller $\downarrow$ REE

EL EFECTO DE LA FRECUENCIA DE LAS COMIDAS SOBRE EL CONTENIDO DE GRASA HEPÁTICA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

IKEM, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Belinova L¹, Kahleova H¹, Hajek M², Dezortova M²,
Hill M³ and Pelikanova T¹

¹Department of Diabetes and ²MR Unit of Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

³Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic

SUPPORTED BY THE PROJECTS:

Ministry of Health, Czech Republic for development of research organ. 00023001 (IKEM, Prague, Czech Republic) - Institutional support
Grant Agency of Charles University - GAUK No 702312

SUMMARY

- Two meals a day reduced hepatic fat content more than a diet with the same caloric restriction divided in more frequent meals in patients with T2D
- This reduction was associated with a decrease in fasting plasma glucose, independently on changes in BMI
- Eating less rather than more frequently may be more beneficial for reducing body weight and HFC in patients with T2D

LOS BOCADILLOS PRODUCEN GRASA EN EL HÍGADO, COMO LA FRECUENCIA DE LAS COMIDAS INFLUYE EN EL DESARROLLO DE NASH Y LA OBESIDAD Z Gastroenterol 2015; 53: 463–465

Requerimientos

Nutriente	EASD	ADA	ALAD
Proteínas	10-20% VCT	No se debe restringir en pacientes diabéticos.	15-30% VCT. No menos de 1g/kg de peso.
Grasas	35%VCT	Cantidad vs calidad	30-45% VCT
Grasas Saturadas	GS + grasas Trans < 10%, adaptar individualmente para MUFA	<7%, limitar grasas Trans Colesterol < 200 mg/ día, adaptar individualmente para MUFA	<7%VCT y grasas trans <1%VCT 12-20%VCT MUFA
Carbohidratos	45-60% VCT	Se debe personalizar	40-60%

EN TIEMPOS DE COVID

¿Qué pasa si los consumo?

ALTO EN GRASAS SATURADAS

ALTO EN AZÚCAR

ALTO EN SODIO

CONTIENE GRASAS TRANS

Produce enfermedades como hígado graso, resistencia a la insulina y diabetes

Hipertensión arterial crónica. A largo plazo ocasiona fallas cardíacas y renales

Aumento de la grasa acumulada en el cuerpo, que ocasionarían un nivel

Pueden aumentar el colesterol no saludable y el riesgo de enfermedades cardiovasculares

**ALTO EN
DELICIA**

**PELIGRO
DE
ADICCIÓN**

**COME
NOMÁS,
GAFO**

Cachangas

SALUDABLE

**PAN FRANCES CON 1/4 PALTA
Y HUEVO SANCOCHADO
(TODO EN EL PAN)
+ NARANJA
+ INFUSION SIN AZUCAR**

**CARBOHIDRATOS:
22.9 gr**

**KCAL:
259**

NO SALUDABLE

**PAN MOLDE CON MANTEQUILLA
Y MERELADA CON LECHE
CHOCOLATADA**

**CARBOHIDRATOS:
305.1 gr**

**KCAL:
469**

SALUDABLE

PAN FRANCES CON QUESO Y
ENSALADA(EN EL PAN)
+ NARANJA
+ INFUSÓN SIN AZUCAR

CARBOHIDRATOS:

31.8 gr

KCAL:

236

NO SALUDABLE

PAN DE MOLDE CON QUESO CREMA
Y JAMONADA Y JUGO (FRUGOS)

CARBOHIDRATOS:

146.6 gr

KCAL:

840

SALUDABLE

1 VASO DE LECHE DESCREMADA
CON PAN FRANCÉS + ACEITUNAS Y
FRESAS

CARBOHIDRATOS:
31.1 gr

KCAL:
213

NO SALUDABLE

1 TAZON DE YOGURT REGULAR
FRUTADO + CEREAL EN CAJA

CARBOHIDRATOS:
227.4 gr

KCAL:
1294

SALUDABLE

1 PAPA SANCOCHADA CON HUEVO
SANCOCHADO + 1 TAJADA DE
SANDÍA + INFUSIÓN SIN AZUCAR

CARBOHIDRATOS:
43.3 gr

KCAL:
266

NO SALUDABLE

1 VASO DE JUGO DE PLATANO CON
LECHE ENTERA Y AZUCAR

CARBOHIDRATOS:
72.3 gr

KCAL:
375

SALUDABLE

1/2 CHOCLO CON 2 TAJADAS DE
QUESO FRESCO + 1 TAJADA DE
PAPAYA

CARBOHIDRATOS:
38.1 gr

KCAL:
256

NO SALUDABLE

GALLETAS RELLENAS Y BOTELLA DE
CHICHA MORADA INDUSTRIALIZADA

CARBOHIDRATOS:
227.1 gr

KCAL:
1419

SALUDABLE

**PAN FRANCÉS CON POLLO
DESHILACHADO CON TOMATE Y
LECHUGA + 1 GRANADILLA +
INFUSIÓN SIN AZUCAR**

CARBOHIDRATOS:
28.7 gr

KCAL:
228

NO SALUDABLE

**PAN CON HOTDOG FRITO CON
MAYONESA Y FRUGOS**

CARBOHIDRATOS:
125.8 gr

KCAL:
749

Cereales

Más grande la porción, más calorías

Arroz

72 Calorías

Quinoa

77 Calorías

144 Calorías

154 Calorías

286 Calorías

308 Calorías

Tomé estas fotos para mostrarte que a más grande la porción, más calorías hay en el plato

30

1 pieza de pan de molde con granos integrales

73 Kcal

1 tortilla blanca

77 Kcal

1 Croissant (70g)

300 Kcal

1 pan francés

83 Kcal

1 pan pita

165 Kcal

1 "wawa"

480 Kcal

1 pan de yema

190 Kcal

33

Sesiones Educativas Online

Laboratorio de Comidas

El plato ejemplar

Combinaciones correctas e incorrectas

x

✓

- Eat breakfast like a king,

- Lunch like a prince,

- Dinner like a pauper

**NO SON TIEMPO PARA DIETAS
NO CONVENCIONALES
CETOGENICA,
AYUNO INTERMITENTE
CATABOLICA
SHAKE
ETC**

NO

Triángulo de la obesidad - COD²

Abordaje integral

**MENSAJES
SIMPLES EN ESTA
CUARENTENA**

Laboratorio de Comidas

El plato ejemplar

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

- Eat breakfast like a king,

- Lunch like a prince,

- Dinner like a pauper

**Seco de cabrito con arroz, frejoles
y yuca frita**

965 kcal

**Seco de cabrito con
frejoles y ensalada**

483 kcal

CONCLUSIONES EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Enfoque motivacional DEL ENDOCRINOLOGO: expresar empatía, desarrollar juicio crítico, vencer resistencias y estimular la autosuficiencia. (OBSERVADORES – MOTIVADORES – LENGUAJE DIRECTO)

Psicoterapia si es necesaria: de tipo Cognitiva, Conductual o Cognitivo-conductual.

Psicoeducación.

OBJETIVOS EN TIEMPOS DE COVID :

- Modificación de hábitos.
- Auto-monitoreo del peso.
- Manejo de la frustración. TELEMEDICINA
- Control de estímulos e impulsos.
- Resolución asertiva de conflictos (PAREJA, FAMILIARES)
- Desarrollar habilidades comunicacionales.
- Reestructuración cognitiva.
- Prevenir las recaídas .
- Monitoreo de las comorbilidades psiquiátricas (Fármacos).
- MUEVETE

**EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA OBESIDAD NO DEBE SER
SUSPENDIDA ESTRATEGIA CONJUNTA ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y
EDUCACION**

1905

1985

2020

Los médicos que conocían de SIFILIS sabían Medicina

Los médicos que conocían de SIDA sabían Medicina

Los Médicos que conocen de COVID saben Medicina

Los Médicos que conocen de OBESIDAD saben Medicina

Los niños no
nacen con
malicia, no
discriminan no
se burlan no
humilla, **hasta**
que un adulto
les enseña.

Los niños no
nacen obesos,
aprenden los
hábitos de sus
padres y de la
gente que lo
rodea.

CIDONPERU
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
DIABETES, OBESIDAD Y NUTRICIÓN

TOÑITO

EL PEQUEÑO QUE VENCIO LA OBESIDAD

Controla tu peso cultivando
buenos hábitos de alimentación.

MUCHAS GRACIAS...